

男性は 50 歳、

女性は 60 歳をすぎたら

# 心房細動

## に注意しましょう



房細動はこれまで病気がない健康な方  
でも加齢により起こってくる病気です。


心房細動は心不全・脳梗塞・認知症などの疾患と  
関連することが分かっており、

早期発見と早期治療が重要です。


心房細動の方の多くは症状が軽いか症状がなく  
(潜在性心房細動)、発見が遅れます。



心臓は正常に  
拍動しています



心房細動では心房に震えが起  
こり、血液の流れが乱れます



挿絵：心房細動週間 Web サイト引用

以下に該当する方は要注意です。

たばこを吸っている

血圧が高い

お酒が多い (2 合以上 / 日)

肝臓が悪いと言われた

肥満と言われた (BMI 25 以上)

脳梗塞があると言われた

尿検査で異常がある

睡眠中、息がとまる・いびきが大きい

自己検脈は心房細動の  
発見に有効です。

QR コード：検脈（脈をとる）の方法



以下に該当する方は病院で相談してください。

脈の乱れがある

動悸・胸のつまり・めまいなどがある



岡村記念病院 循環器内科（不整脈）は、  
心房細動の早期発見のためにご相談を受け付けています。  
<https://www.okamura.or.jp/>



病院ホームページ

相談窓口

（055）973-3221